

18-20

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ξενοδοχείο
ROYAL OLYMPIC

www.helspghancongress.gr

5^o



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

"Παιδιατρική Γαστρεντερολογία,
Ηπατολογία και Διατροφή
στην Κλινική Πράξη"

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
22
ΜΟΡΙΑ
(CME/CPD CREDITS)

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67, 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | Τ. 2106727533
W. www.helspghan.org | E: helspghan@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



EVEREST TRAVEL & CONGRESSES

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14-16, 10552 ΑΘΗΝΑ

T: 2103249242

W: www.everesttravel.gr

E: conference@everesttravel.gr

AA14

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κουλουριώτης Γεώργιος-Χρήστος¹, Βαρβαρέλης Ορφέας¹, Ζάβρας Νικόλαος², Αχιλλέως Ορθόδοξος¹, Πασσαλίδης Αλέξανδρος¹

1. Νοσοκομείο Παιδών 'Παν.& Αγλαΐας Κυριακού', Αθήνα
2. Γενικό Νοσοκομείο 'Αττικόν', Αθήνα

Εισαγωγή: Η οξεία σκωληκοειδίτιδα αποτελεί μία από τις συχνότερες νόσους που αφορούν την κοιλιακή χώρα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Την τελευταία δεκαετία διάφορα κέντρα ανά τον κόσμο αναφέρονται σε πιθανή συσχέτιση των προχωρημένων και σοβαρών περιστατικών οξείας σκωληκοειδίτιδας με την αύξηση των επιπέδων χολερυθρίνης στο αίμα του ασθενούς σε πληθυσμό ενηλίκων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διενεργηθεί καμία μελέτη, η οποία να εξετάζει αυτή την πιθανή συσχέτιση σε παιδιατρικό πληθυσμό.

Σκοπός: Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να αναδείξει πιθανή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων χολερυθρίνης και της παρουσίας και της βαρύτητας της οξείας σκωληκοειδίτιδας.

Υλικό και Μεθοδολογία: Στη συγκεκριμένοι μελέτη οι ασθενείς, οι οποίοι από τον κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο εισήχθησαν με υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας, εξετάστηκαν ως προς τα επίπεδα χολερυθρίνης στο αίμα, σε βάθος ενός εξαμήνου από την έναρξη της μελέτης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συσχετίστηκαν με τα διεγχειρητικά και παθολογοανατομικά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα χολερυθρίνης και τη σοβαρότητα της οξείας σκωληκοειδίτιδας.

Αποτελέσματα: Σε σύνολο 130 ασθενών 8 εμφάνισαν Γαγγραινώδη σκωληκοειδίτιδα, 6 εμφάνισαν Περιτονίτιδα και 2 εμφάνισαν Plastron σκωληκοειδούς, ενώ οι υπόλοιποι είχαν μη επιπλεγμένη μορφή σκωληκοειδίτιδας. Στο σύνολο των 130 ασθενών 18 εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης, ενώ μετά από στατιστική ανάλυση με χρήση SPSS αναδεικνύεται συσχέτιση των επιπέδων της χολερυθρίνης με την ιστολογία της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Συμπεράσματα: Η τιμή της χολερυθρίνης φαίνεται ότι αυξάνεται σε προχωρημένες μορφές σκωληκοειδίτιδας, αλλά δεν φαίνεται να αυξάνεται σε πιο ήπιες μορφές. Μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της βαρύτητας της οξείας σκωληκοειδίτιδας.